小鼠实验器械及摆放







小鼠固定器3,灌胃针2, 1 ml注射器2;止血钳2; 组织 剪和眼科剪各1; 镊子2; 培养皿1; 烧杯1。

- 1. 小鼠颈椎脱臼处死,去除手术线及胶布。
- 2. 桌面、BL-420N硬件表面、器械洗净擦干,按此摆放后,方可找老师签名。全组成员同时离开,不可组内部分同学先走;离开前凳子摆放整齐。



小鼠的基本手术操作

实验教学管理中心 李翠限 徐小元




- √■抓取、固定
 - 编号与标记
- ✓ 腹腔注射、尾静脉注射(0.1ml/次)
- √ 灌胃(0.1ml/次)
- √ 眼眶取血
- √ 处死: 颈椎脱臼


打\的为考试内容,一人一只小鼠练习

实验小鼠标记编号



对实验鼠无生理和实验反应,号码清楚、易认、耐久和适用。





小鼠抓取







要点:一手拉尾部,另一手大拇指、食指抓耳后皮肤;

无名指和小指压住尾部

小鼠腹腔注射









位置: 左下腹

角度: 45°

过程: 先回抽

再注射

剂量: 0.5ml


大鼠腹腔注射给药需要注意的问题,选择:


- A. 捉持大鼠使头部略低于尾,避免伤及腹腔器官
- B. 垂直刺入下腹外侧
- C. 针头与皮肤呈45°角刺入腹腔


注意手的姿势

小鼠尾静脉注射操作及细节










45℃水浴2 min 或喷75%酒精




小鼠灌胃









45°, 从嘴角插入; 灌胃针压平, 继续全部插入; 抽回无气泡, 推药

大鼠灌胃给药需要注意的问题,选择:

- A. 灌胃针自口角插入口腔
- B. 灌胃针轻压上颚, 使口腔和食道成一条直线
- C. 如遇阻力,不可强行插入,以免刺破食管或误入气管
- D. 灌胃针插入适宜深度为4-6cm, 过深动物死亡,


过浅药物溢出

小鼠眼眶取血







采血量一般为 0.2-0.3 mL, 适于多次重复采血









于颈部加压力,使眼球充分外突,眼眶后静脉丛充血

小鼠处死---颈椎脱臼法









一手拉尾巴中部或根部,另一手大拇指、食指按住头部(不要压住颈椎); 拉住尾根部往后上方扯,使颈椎脱臼。